



Dipartimento di Chirurgia Generale e d'Urgenza
(DCG)

Schema terapia ponte domiciliare pre-operatoria per i pazienti in terapia anticoagulante orale (TAO)

Riferimento procedura: PR75100DCG.000

Paziente..... nato il

Intervento/procedura

In terapia anticoagulante orale con **Coumadin** alla dose di

In terapia anticoagulante orale con **Sintrom** alla dose di

Ultimo **INR** data valore

Schema di terapia ponte pre-operatoria domiciliare:

	-6	-5	-4	-3	-2	-1	intervento
data							
giorno							
COUMADIN/ SINTROM§	**	stop	stop	stop	stop	stop	
CLEXANE				dose _____	dose _____	dose _____	
Calciparina^				dose _____	dose _____	dose _____	
RICOVERO				—	—	—	

** Se l'INR di base è in range (2.0-3.0) il Coumadin viene sospeso 5 giorni prima

** Se l'INR di base è > 3.0 il Coumadin viene sospeso 6 giorni prima

§ In caso di terapia anticoagulante con Sintrom la terapia ponte viene iniziata con 1 giorno di anticipo

^ L'impiego della Calciparina è riservato ai casi di insufficienza renale grave (creatinina > 2.0 mg%, eGFR < 30 ml/min corretta per la superficie corporea del paziente).

Data

Medico